

كل ما يجب معرفته عن فترة الحمل

مقالات

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الثلث الثاني من الحمل

يونيو 8, 2022

تشعر العديد من النساء بالنشاط وبصحة جيدة خلال الثلث الثاني من

ما يجب فعله وما لا يجب فعله
في الثالث الثاني من الدحمل

- تغير العديد من النساء بال شيئاً وبصمة جديدة خلال الثلث الثاني من الحمل، حيث أن الواصم التي متخصصة حادة، تحدث في المقام الأول تغيرات على الدرندة هذه أيضاً تغيرات من التمو والتغير السريع للملكت، وقد تحدث في بعض منتعلة بالعوالم الطيبة والمتعددة لولادة

ما يجب فعله

زيارات ما قبل الولادة المنتظمة

• زيارات ما قبل الولادة هي عنصر حيوي للبقاء بصحة جيدة وتحفظ صحة الأم.

• سيعزز عدد عمليات زيارة المطهير وتحفيز المقاولات المثودية . ولتكن المقدمة

- سیستم فکری مبتنی بر دلایل فیزیکی کل ریاضی در طبقه دویست و هشتاد و هشت در درجه اول از مجموعه مکانیک انتقالی می باشد.

- سيقوم طبيبك أو الممرضة بفحص بطنك واستئصال إلى تقييم قلب طفلك نموه أو نموها إذا لم تتحصل على المروضات فوق الصونية خلال الشهور الثلاثة وقد تتحصلين على واحدة في موعدك الثاني إلى 18 أسبوعاً.

حافظ على صحتك

- في المرحلة الثانية من العمل، ٥٥٪ في اتجاهات المشي والسباحة، والسباحة وركوب الدراجات الناتجة كدربارات نشاط يتحقق إلى حدٍ أقل.

٤٠ ينبع الشطبة الزلادة والأشطة التي تضررت لخطر المسقوط او الازد (ذمة في معدن) او المسقوط الزلادة

كللي مشاكل النوم

- يسبب التغيرات المفاجئة ، تمايز العدد من النساء من النساء الألف
- والشعور بالاحتقان
- يمكن أن تساعدك بذل المحلول الملحي لأنك في
- تجربة للنار

www.english-test.net

- مزايا الإفلاع عن التدكين
- لم يجد الوان ابداً لكتابه

- تضييق بنسوة
- ملء كل بعس من اصحاب الالئاع من المدخنون
- انت تعتقدن الالئاع تجده مملئ
- تقل احتقانية حدوث الاصحائين او الاغاث
- عدو تقليل من انت تجده مملئ ببعض الاصحائين موت الوجه المدخنون
- يهلل تضييق بعس من المدخنون مملئ ببعض الارواح او بعضا من نفس الون
- تضييق الالئاع من المدخنون مملئ في وقت قدره من يوم - بعدي

- بعدها ينطلق حمل إعلامي يهدى إلى إدانة المدحوب
- من الأسباب التي أدت إلى ذلك:
 - انتشار المحتوى والذكريات الموروثة
 - انتشار نسخ تزويرية عن ٢٠١٣
 - انتشار المحتوى والتزييف المنهجي
 - انتشار المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي
 - انتشار محتوى على وسائل الإعلام
 - انتشار المحتوى على المواقع الإلكترونية

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الثلث الثاني من الحمل

تشعر العديد من النساء بالنشاط وبصحة جيدة خلال الثلث الثاني من الحمل. من الواضح أنك ستصبحين حاملاً ، لكنك لن تكوني ثقيلة على الحركة. هذه أيضاً فترة من النمو والتطور السريع لطفلك ، وقد تجدين نفسك منشغلاً بالفحوصات الطبية والاستعدادات للولادة.

ما يجب فعله

زيارات ما قبل الولادة المنتظمة¹

- زيارات ما قبل الولادة هي عنصر حيوي للبقاء بصحة جيدة وضمان صحة طفلك
- سيحدد عدد مرات زيارة الطبيب وفقاً لظروفك الفردية ، ولكن العديد من النساء يراجعون الطبيب كل 4 إلى 5 أسابيع
- سيتتم فحص ضغط الدم لديك في كل زيارة خلال الثلث الثاني من الحمل ، بالإضافة إلى التورم في يديك وقدميك. قد يتم قياس وزنك وسحب الدم منك للاختبارات وفحص بولك.
- سيقوم طبيبك أو الممرضة بفحص بطنك والاستماع إلى نبضات قلب طفلك لتبقي نموه أو نموها. إذا لم تحصل على الموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، فقد تحصلين على واحدة في حوالي 18 إلى 20 أسبوعاً.

حافظي على صحتك¹

- من المهم أكثر من أي وقت مضى تناول الطعام الصحي والبقاء نشطة أثناء الحمل ؛ إنه مفيد لصحتك الجسدية والعاطفية ، وكذلك لصحة طفلك
- في المرحلة الثانية من الحمل ، ضعي في اعتبارك المشي والسباحة واليوغا وركوب الدراجات الثابتة كخيارات نشاط خفيف إلى معتدل
- لا ينصح الأنشطة الزائدة والأنشطة التي تعرضك لخطر السقوط أو الأذى (خاصة في معدتك) أو السخونة الزائدة
- من المهم أيضاً أن تأكلين جيداً أثناء الحمل - لكن هذا لا يعني "تناول الطعام لشخصين". لقد ثبت أن ما تستهلكينه أثناء الحمل يؤثر على نمو طفلك وصحته لاحقاً في الحياة

قللي مشاكل النوم²

تنتظرك تحديات جديدة في الثلث الثاني:

- بسبب التغيرات الهرمونية ، تعاني العديد من النساء من انسداد الأنف والشعور بالاحتقان. يمكن أن تساعدك بخاخات المحلول الملحي للأنف في تخفيف الأعراض

- قد تؤدي تقلصات الساق في بعض الأحيان إلى صعوبة النوم. تشنجات الساق غير مفهومة تماماً، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدتها على التخلص منها ، مثل:

- شد عضلات ربلة الساق،
- البقاء نشطة خلال النهار،
- شرب قدر كاف من الماء
- بعض النساء تراودها الأحلام ، أو أحلام غريبة أو كوابيس أكثر من المعتاد. يمكن أن يكون مرتبطاً بالتوتر، أو قد يكون ناتجاً عن التقطع في النوم
 - حاولي الالتزام بالروتين اليومي وجريبي وضعيات نوم مختلفة أو وسادة حمل.
 - إذا كانت لديك أحلام مزعجة ، فتحدي إلى شريك أو صديقة لك عن ذلك ، أو فكري في رؤية استشاري.
 - لأول مرة في حياتهم ، يبدأ بعض الناس بالشخير.
 - النوم على جانبك مع رفع رأسك قليلاً يمكن أن يكون مفيداً.
 - الحفاظ على نظام غذائي صحي وعدم زيادة الوزن يمكن أن يكون مفيداً أيضاً

ما لا يجب فعله

لا تدخين³

لم يفت الأوان أبداً للاستسلام

- مزايا الإقلاع عن التدخين
- عند الإقلاع عن التدخين ، فإن الغازات الضارة (مثل أول أكسيد الكربون) والمواد الكيميائية الأخرى ستخرج من جسمك بسرعة
- فيما يلي بعض أسباب الإقلاع عن التدخين:
 - أنت تفعلين الأفضل لصحة طفلك
 - تقل احتمالية حدوث الإجهاض أو الإملاص
 - سوف تقلل من احتمالية موت المهد(متلازمة موت الرضيع المفاجئ).
 - يقل احتمال أن يولد طفلك قبل الأوان أو يعاني من نقص الوزن.
 - سيفيد الإقلاع عن التدخين طفلك في وقت لاحق من حياته - يعاني بعض الأطفال من الربو وأمراض خطيرة أخرى نتيجة تدخين أمهاتهم أثناء الحمل.

لا تشربين الكثير من الكافيين⁴

يمكنك تناول الكافيين ، ولكن يُسمح فقط بـ ٢٠٠ مجم في اليوم

- حيث يوجد:

- في كوب من القهوة سريعة التحضير ١٠٠ ملغ
- في كوب من القهوة المفلترة ، هناك ١٤٠ مجم.
- ٧٥ مجم لكل كوب من الشاي (الشاي الأخضر يمكن أن يحتوي على نفس كمية الكافيين الموجودة في الشاي العادي)
- علبة كولا تحتوي على ٤٠ ملغ من الكافيين.
- في عبوة سعة ٢٥٠ مل من مشروب الطاقة ، يوجد ٨٠ ملغ.
- تحتوي قطعة ٥٠ جرام من الشوكولاتة الداكنة الأساسية على أقل من ٢٥ مجم من الكافيين
- تحتوي قطعة ٥٠ جرام من شوكولاتة الحليب العادي على أقل من ١٠ مجم من الكافيين

أشياء يجب أن تكوني على دراية بها

بينما يختلف حمل كل امرأة ، يجب التحدث مع طبيبك إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:^٥

- آلام في البطن أو تقلصات شديدة
- حمى تزيد عن ٣٨ درجة مئوية (١٠٠ درجة فهرنهايت)
- السوائل أو التزيف المهبلي
- تورم يحدث بشكل مفاجئ أو غير متوقع
- إفرازات مهبالية ذات رائحة
- التبول المؤلم
- الصداع الشديد والمستمر
- دم في القيء
- مشاكل في التنفس
- خفقان القلب

المراجع :

Pregnancy, Birth and Baby. Second trimester .1
Last reviewed: May 2020

Available at: <https://www.pregnancybirthbaby.org.au/second-trimester>
Last accessed at: 20/02/2022

Pregnancy, Birth and Baby. Sleep during pregnancy .2
Last reviewed: January 2020

Available at: <https://www.pregnancybirthbaby.org.au/sleep-during-pregnancy>.
Last accessed at: 20/02/2022

NHS Smoking .3

Available at: <https://www.nhs.uk/start4life/pregnancy/smoking>
Last accessed at: 20/02/2022

NHS Foods to avoid in pregnancy .4

Page last reviewed: 16 April 2020

Available at: <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid>
Last accessed at: 20/02/2022

UNICEF Parenting. Your second trimester guide .5
Available
at: <https://www.unicef.org/parenting/pregnancy-milestones/second-trimester>
Last accessed at: 20/02/2022